

ラツーダ[®]錠を 服用されている方へ

<統合失調症・双極性障害におけるうつ症状の改善>



ラツータ錠[®]を服用されている方へ

ラツータは、脳の中の神経伝達物質のバランスを整えることにより、病気の症状をやわらげる効果があるお薬です。

ラツータの飲み方

- 1日1回、食後に服用してください。

空腹時に飲むと、お薬の効果が十分に得られないことがあります。



- お薬を飲む量はあなたの症状に合わせて調整されています。

主治医の指示通りに飲んでください。

あなたの判断で飲む量を変えたり、飲むのを止めたりすると、症状が悪化してしまうことがあります。

ラツータを飲む前に…

ラツータには一緒に飲んではいけないお薬があります。他のお薬^{*}を飲んでいる場合は、主治医または薬剤師に伝えてください。

^{*}:市販のお薬やサプリメントも含まれます。

▼裏面もお読みください。

⚠️ ラツダ服用中に注意すること

- 自動車の運転など危険をとまなう機械の操作はしないでください。

ラツダを飲むと、眠くなったり、注意力が低下したりすることがあります。



- 飲酒は控えてください。

アルコールはラツダの作用を強めることがあります。

- グレープフルーツジュース等を摂取しないでください。

グレープフルーツジュース等のグレープフルーツ含有食品はラツダの作用を強めることがあります。



- 次のような症状などがあらわれたら、すぐに主治医に連絡してください。

- 急激な発熱
- 舌を動かしたり、舌を出し入れしたり、絶えず嘔むような口の動き
- 手足のふるえ
- 筋肉のこわばり
- のどが渇く、水を多く飲む、尿の量や回数が多い
- 不安感が強くなる、イライラする、興奮しやすい、ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来すなど、症状や行動の変化

その他にも何か気になる症状などがありましたら、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

