

ロナセン[®]錠/散を
服用されている方へ



ロナセン[®]錠/散を服用されている方へ

ロナセンは、脳の中の神経伝達物質のバランスを整えることにより、考えをうまくまとめられない、意欲がわからない、幻覚や妄想などの症状をやわらげる効果があるお薬です。

ロナセンの飲み方

- **1日2回、食後に服用してください。**

空腹時に飲むと、お薬の効果が十分に得られないことがあります。

- **お薬を飲む量はあなたの症状に合わせて調整されています。主治医の指示通りに飲んでください。**

あなたの判断で飲む量を変えたり、飲むのを止めたりすると、症状が悪化してしまうことがあります。



ロナセンを飲む前に…

ロナセンには一緒に飲んではいけないお薬があります。他のお薬^{*}を飲んでいる場合は、主治医または薬剤師に伝えてください。


^{*}市販のお薬やサプリメントも含まれます。

▼裏面もお読みください

ロナセン服用中に注意すること

- 危険をとまなう機械の操作はしないでください。
(自動車の運転、危険性の高い電動工具の使用など)

ロナセンを飲むと、眠くなったり、
注意力が低下したり
することがあります。



- お酒(アルコールを含む飲食物)は
ひかえてください。

アルコールはロナセンの作用を強めることがあります。

- グレープフルーツジュースは
ひかえてください。

グレープフルーツなどに含まれる成分は
ロナセンの作用を強めることがあります。



- 次のような症状があらわれたら、すぐに
主治医に連絡してください。

- 急激な発熱(38℃以上)
- 舌を動かしたり、舌を出し入れしたり、絶えず嚙むような
口の動き
- 手足のふるえ ● 筋肉のこわばり
- のどが渇く、水を多く飲む、尿の量や回数が多い

気になる症状がありましたら、
主治医または薬剤師に相談してください。

住友ファーマ株式会社

