

ルーラン[®]錠を服用されている方へ

ルーランは、脳の中の神経伝達物質のバランスを整えることにより、考えをうまくまとめられない、意欲がわからない、幻覚や妄想などの症状をやわらげる効果があるお薬です。

ルーランの飲み方

- 1日3回、食後に服用してください。

空腹時に飲むと、お薬の効果が十分に得られないことがあります。

- お薬を飲む量はあなたの症状に合わせて調整されています。主治医の指示通りに飲んでください。

あなたの判断で飲む量を変えたり、飲むのを止めたりすると、症状が悪化してしまうことがあります。



ルーランを飲む前に…

ルーランには一緒に飲んではいけないお薬があります。他のお薬を飲んでいる場合は、主治医または薬剤師に伝えてください。

ルーラン服用中に注意すること

- 自動車の運転など、危険をとまなう機械の操作はしないでください。

ルーランを飲むと、眠くなったり、注意力が低下したりすることがあります。



- 飲酒は控えてください。

アルコールはルーランの作用を強めることがあります。

- 次のような症状があらわれたら、すぐに主治医に連絡してください。

- 急激な発熱(38℃以上)
- 舌を動かしたり、舌を出し入れしたり、絶えず噛むような口の動き
- 手足のふるえ
- 筋肉のこわばり
- のどが渇く、水を多く飲む、尿の量や回数が多い

気になる症状がありましたら、
主治医または薬剤師に相談してください。

住友ファーマ株式会社