

オプソ[®]内服液を服用されている方へ


この内服液は、強い痛みをやわらげるものです。中身の無色透明な液に痛みをやわらげる成分が溶けています。ご使用になる前につぎの注意事項をよく読んでください。

飲み方

この内服液の飲み方には、1日のうち「定時に服用する場合」と「臨時に服用する場合」の二通りありますので、飲む時間など医師、薬剤師の説明にしたがって正しくお飲みください。




開け方

- ① 「切り口」を上にし「耳」の部分を持って、中身の液をこぼさないように注意して「切り口」の線にそって切り取ります。指で押さえる部分に注意してください。



飲み方

- ② 「切り口」から液をこぼさないように口に運び飲みます。
- ③ a または b を持って、他方の指で矢印の方向に、中身が残らないように液をこすり出し、飲み残しがないようにしてください。



空になったアルミの容器は廃棄してください。

服用時の注意点

- 1 患者さん本人以外は絶対に服用しないでください。また、他の人には渡さないでください。
- 2 服用中は、ねむけ、めまいが起こることがありますので、車の運転や危険を伴う機械の操作は避けてください。
- 3 このくすりを飲むと、吐き気、ねむけ、便秘などの症状があらわれることがあります。このような場合には、医師や薬剤師にご相談ください。また、息切れ、呼吸のみだれなどがあらわれた場合には、すぐに医師や薬剤師に連絡して説明を受けてください。
- 4 痛みがおさまっても、医師の説明どおり服用し、自分の判断でくすりの使用をやめないでください。
- 5 開封後はすみやかに服用してください。

保管するときの注意点

- 1 小児の手の届かない場所に保管してください。
- 2 室温(1~30℃)で保管してください。

その他、残ったくすりの処分など、このくすりに関するお問い合わせは担当の医師、または薬剤師におたずねください。

医療機関名