レミッチ®OD錠をお飲みになる方へ

お飲みになる前に必ずお読みください。

レミッチ®は透析または肝疾患治療を受けている方のかゆみを改善する薬です。

次のような方は、ご使用前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- 妊娠または授乳中。
- ほかに薬を使用している。

（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めてほかに使用中の医薬品があれば伝えてください。）

飲み忘れたらどうしたらいいの？

夕食後の服用を指示されている場合、飲み忘れに気が付いたのがその日の就寝前ならば、1回分を飲んでください。
それ以外の場合は、飲み忘れた分は1回とばして、次の通常飲む時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。

何かわからないこと、気になることがありましたら
医師または薬剤師におたずねください。

連絡先（病医院・薬局名）

レミッチ®OD錠2.5μg

（原寸大）

保管方法・服用方法について

- 気温の高い場所や光が直接当たる場所での保管は避けてください。
- 本剤は舌の上にのせ、唾液を含ませ舌で軽くつぶしてから、唾液のみで服用することができます。また、水で服用することもできます。

鳥居薬品株式会社　住友ファーマ株式会社

〔2022年4月改訂〕RMT P-01566v05

この薬の服用中、特に気をつけてほしいこと

下記のような症状に気づいたら、医師または薬剤師に相談してください。

●なかなか寝付けない

●便秘になる
●おしっこが近くなる※

●眠気がする
●めまいがする

※おしっこが近くなる症状は、肝疾患治療を受けている方に気をつけてほしい症状です。

▶飲み始めてから、透析を受けている方は2週間、肝疾患治療を受けている方は4週間、特に気をつけてください。
また、この薬を長い間飲まれている方でも体調の変化によって、このような症状があらわれることがあります。

▶眠気やめまいなどが起こることがありますので、自動車の運転や危険を伴う機械を扱わないようにしてください。