

— メトグルコ®錠 適正使用のお願い —

メトグルコ服用中は脱水に注意するようご説明ください

脱水状態でメトグルコ服用を継続し、重篤な乳酸アシドーシスが発現した事例が報告されています。脱水状態では乳酸が蓄積しやすくなりますので、乳酸アシドーシスの発現、重症化を予防するために、患者さんやご家族の方へ下記の点についてご説明ください。

- 適度に水分をとるよう心がけてください。
- 発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良のときには脱水を起こすことがありますので、メトグルコをのむのをいったんやめて、医師または薬剤師に相談してください。
- 飲酒によっても脱水を引き起こすことがありますので、お酒を飲みすぎないでください。

利尿作用のある薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に脱水にご注意ください。なお、脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行ってください。

メトグルコ®錠を服用されている方へ
— 乳酸アシドーシスの発現を避けるための注意 —

**メトグルコ®錠をのんでいる間は
次のことにご注意ください。**

- 次の状態（シックデイ）のときには、脱水を起こすことがありますので、メトグルコをのむのをいったんやめて、医師または薬剤師に相談してください。

 下痢、嘔吐（おうと）

 食欲がなく、食事がとれない

 熱がある

- 脱水を予防するため、適度に水分をとるよう心がけてください。
- お酒を飲みすぎないでください。



⚠ まれに乳酸アシドーシスという治療が必要な副作用がおこることがあります。吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、体がだるい、筋肉痛、呼吸が苦しいなどの症状が、ひどいときまたは続くときは、すぐに受診してください。

（連絡先等）

住友ファーマ株式会社

乳酸アシドーシスの発現を避けるための注意点を記載した患者さん向け資料をご用意しておりますので、ご活用ください。

【その他資料】

- 患者さん向け資料（資料番号：MET P-34745）
「メトグルコを服用される方へ」（B5版）
→製剤の写真を掲載しています。
- 医療関係者向け資料（資料番号：MET P-38900）
「投与時チェックシート」

資料につきましては、弊社担当MR又はくすり情報センターまでお問い合わせください。弊社医療関係者向けサイト（アドレス：<https://sumitomo-pharma.jp>）からご請求いただくこともできます。

患者さん向け資料（資料番号：MET P-32911）
「メトグルコ服用中の注意点」（A5版）

製造販売元

住友ファーマ株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町 2-6-8

〈製品に関するお問い合わせ先〉

くすり情報センター

TEL 0120-034-389

受付時間/月～金 9:00～17:30(祝・祭日を除く)

<https://sumitomo-pharma.jp/>

添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」でGS1バーコードを読み取ると、最新の電子化された添付文書等を閲覧できます。



(01)14987116530009