

What's?

## 統合失調症とは?

- 考えがまとまりにくくなる病気です。
- およそ100人に1人がかかる、決して珍しくない病気です<sup>1)</sup>。

1) 松岡洋夫：精神経誌., 109 : 189, 2007

## 統合失調症の主な症状

### 陽性症状

#### 幻覚

- 誰もいないのに人の声が聞こえる(幻聴)
- 実際には存在しないものが見える(幻視)



#### 妄想

- 現実には起こっていないことを信じてしまう



#### 感情の障害

- 感情の変化が少なくなる
- 他人の感情や表情についての理解が苦手になる



#### 意欲の障害

- 仕事や勉強をする意欲がわからない
- 無口で自分の世界に閉じこもってしまう
- 身なりに気をつかわなくなる



### 陰性症状

### 不安・抑うつ

#### 気分の落ち込み

- 何をしても気分が晴れない



#### 不眠

- 寝ようとしても眠れない、朝早く目が覚める



#### 記憶の障害

- 物事を覚えるのに時間がかかる



#### 注意の散漫

- 集中しないといけない場所で、他のことに注意がそれてしまう



#### 判断の鈍化

- 物事の段取りができなくなる



### 認知機能障害

Check!

## 統合失調症の治療の基本は お薬による治療(薬物療法)です

適切な治療をきちんと継続することで、  
統合失調症の症状の改善が望めます。



## ラズーダ錠とは

- 脳内の情報伝達物質のバランスを整えることにより、統合失調症によるさまざまな症状を改善します。
- ラズーダ錠20mg、40mg、60mg、80mgを服用する量にあわせて飲みます。

ラズーダ  
20

20mg

ラズーダ  
40

40mg

ラズーダ<sup>®</sup> 60

60mg

ラズーダ<sup>®</sup> 80

80mg

## 飲み方

- **1日1回食後**に服用します。
- ラズーダは**食事の後**に服用することで吸収されやすくなるため、**必ず食事の後に服用**してください。



## ラズーダ服用中に次のような症状がみられることがあります

次のような症状がみられた場合には医師、薬剤師に相談するようにしてください。



体が落ち着かず、  
じっとしてられない



胸がムカムカする  
気持ち悪い



手が震える  
手のこわばり

## 服用にあたって

- お薬は**毎日飲み続ける**ことが大切です。  
病気の症状が落ち着いてきたからといって、自分でお薬を飲むのを止めたり、減らしたりすると再発のおそれがあります。また、自分の判断でお薬を増やしてしまうと副作用が出る可能性があります。  
**飲み忘れにも注意**が必要です。
- 症状の程度や経過などは個人差があります。  
**あせらず治療**していきましょう。
- 不安なことや心配なことは、医師、看護師、薬剤師に遠慮なくご相談ください。

